健康檢查 規劃與執行 （國中端）

林怡君 護理師
台中市立爽文國中

學生健康檢查實施辦法

第 5 條 學校辦理學生健康檢查前，應通知學生及家長，說明檢查之意義、項目及注意事項，並將學生健康基本資料及平日健康狀況，提供檢查人員參考。

第 6 條 學生健康檢查實施後一個月內，應將檢查結果通知學生及家長。但學生已成年或有行為能力者，應經本人同意後，始得將檢查結果通知家長。

第 7 條 學校對健康檢查結果發現異常之學生，應自行或協助家長採取下列相關措施

- 一、實施健康指導，輔導學生對異常項目進行轉介複查及適當矯治，並予追蹤。
- 二、對罹患傳染性疾病學生，應依衛生主管機關相關法令辦理。
- 三、對罹患特殊疾病學生，應進行個案管理，並妥適安排其參與之活動。

第 8 條 學校應將學生健康檢查及矯治結果，依規定格式予以記錄並建檔、統計，必要時，應知會相關人員共同維護學生活動安全，並依健康檢查結果辦理學生健康促進活動。

前項學生健康檢查紀錄卡格式，由中央主管機關定之。

一、依據：

為提升國民中小學學生健康檢查品質，訓練觀察員參與健康檢查工作，期藉由外部觀察員之設置，讓各校檢查工作內容、流程能確依規定標準化，進而使學生健康檢查能獲得更佳效益，訂定本說明。

一、依據：

教育部訂頒「中央補助直轄市及縣(市)政府國民中小學學生健康檢查經費執行工作要點」

其中第 8 點規定：「直轄市、縣(市)政府於廠商履約期間，應請受檢學校指定學務主任或衛生組長擔任協助驗收人員，並得由家長或志工協助，針對檢查團隊之身分、資格及檢查過程，**確認廠商依採購契約內容辦理學生健康檢查工作，確保學生健康檢查之品質。**」

PART ONE

學校 校內分工

學務、總務、教務、人事等

身體診察 實施原則-學校端

檢查前

學校
行政處室

- 日期、人數、時程
- 工作團隊(導師、志工、行政單位等)

學校
護理人員

- 紀錄卡片提供
- 完成疾病史、
- 與醫院端確認細則、雙方配合事宜

實施原則-學生端

檢查前

- ◆**特殊疾病、健康狀況調查：** 學生健康基本資料、平日健康狀況
- ◆**家長同意書**
 1. 通知學生及家長，說明意義、注意事項及項目
 2. 胸部、腹部、♂泌尿生殖器、血液檢查

學生健康檢查實施辦法第5條

衛福部國健署

〔學校健康檢查知情同意及隱私權保護原則〕

注意

PART TWO

健康中心 護理師

實施前應完成工作

學校護理師

檢查前

事前說明 (導師與學生及家長等) ■

檢體收集及器材

備齊表件：工作說明書、家長通知書、名冊….

教導注意事項

校內行政工作

- 日程表、受檢人數、檢查用具及方法
- 醫療人力、雙方配合事宜

PART Three

健康檢查 現場篇

身體診察你應該知道的事

健康檢查項目

身體診察 (理學檢查)

血壓脈搏、眼睛、耳鼻喉、頭頸部、胸部、脊柱四肢、腹部、♂ 泌尿生殖器、皮膚、口腔等
...

實驗室

尿液與血液檢查

增列項目

血壓、心電圖檢查

檢查人員資格

專科醫師：
執業執照、專科醫師證書
承辦醫院在職證明或報備支援證明

護理人員
執業執照、專科醫師證書
承辦醫院在職證明或報備支援證明

檢驗人員(同上)
尿液、寄生蟲及血液檢體：醫檢師
採血：醫事人員執業執照

行政人員 **×**
不得執行實際檢查工作

健檢工作隊行政管理

- 專科醫師條件或登陸條件
- 健檢醫療人員應具備**執業執照**
- 工作隊在執行工作時應配戴醫院之**識別證**

檢查內容與執行方式

一.尿液

二.全身性理學檢查

國中生新生入學時檢查項目

實驗室檢查人員

尿液檢查

- 檢驗方式
 - 現場
 - 合格醫檢師*2
- 實驗室/檢驗室-冷藏設備
 - 送達時效

學生健康檢查方法

實驗室檢查

尿液檢查

- 直接檢驗
- 集體採檢送驗

血液檢查

- 國，高中
- 高危險群
- 其他階段視情況需要

💡 壹、尿液篩檢工作

1. 執行方式

2. 學校方面 | (匿名篩檢) 1:100 同時

3. 初檢項目

含尿液酸鹼度 (pH值)、尿糖、尿蛋白、潛血

4. 複檢

5. 保存方法 |

立刻送檢，愈新鮮愈佳，室溫下以不超過 1 小時為原則；置於 2°C~8°C 冷藏設備，盡快送檢

尿液

初檢：事前衛教

- 試紙→尿液沉渣
或顯微鏡檢

複檢

- 初檢異常、請假、
生理期

1. 採集後立刻受檢(新鮮)
2. 生理期結束後採集
3. 飲食禁忌：109年刪除清涼飲料
4. 收集中段尿

規定項目：抽血及檢體部分

採血

- 至少空腹8小時
- 10點前完成、無菌技術採血(酒精棉)
- 3種 **姿勢 ****

試管 共2管

- 生化試管 (紅或黃) Clot **一定要靜置血清與血球分離**
CBC試管 (紫) EDTA **宜輕輕+溫柔+秀氣的搖晃****

抽血及檢體部分

保存

- 抽完後：置室溫30~60分鐘
- 沉澱後；再放置冷藏設備(2~8. C)
- 冷藏車

報告

- 與理學檢查報告同時給學校
- 時程：依規定
- 異常通知/危險臨界值通知

國中生新生入學時檢查項目

身體診察人員配置

每組人力

共計8名

牙科醫師1-2名/
小兒(內)科、家
醫科 專科醫師 2名
/組

跟診護理人員
*2名/組

工作助理
行政幹事
各1名

EKG判讀-心臟專科醫師

每位學生需接受2-3位/站醫師檢

~~一同受檢~~

學校聽力篩檢

- 檢查者站於受試者正後方，將音叉振動後放置於學生額頭正中線後方，詢問學生左右兩側中哪一側可以聽到較大聲音。
- 若初篩有異常，應先了解學童有否智能認知障礙，若無再做 Weber test 及 Rinne test
- 通常學校只做一般簡易篩檢，有異常到ENT做進一步檢查。

檢查動作示範

Rinne test

- 不可與外耳道平行
- 垂直外耳道1CM處

耳鼻喉科檢查

聽力篩檢

學校的聽力檢查為篩檢性質

1. 準備工具：512Hz音叉(頻率為人類語音範圍)
2. 檢查場所：安靜、無干擾，採一對一檢查

將音叉放在拇指和食指間迅速摩擦，或用指節輕敲，使它輕輕的振動

NG 影片

Weber's test

- 骨導偏向試驗：
額頭或頂部中線
- 中間 (骨導音和氣導音)
聽力正常
或兩側耳聽力障礙相等
- A 傳導性失聰：A 耳受影響
- A 神經性失聰：B 耳受影響

選用128或256Hz音叉，記錄為Weber試驗偏左或偏右

Rinne test 骨氣導比較 512Hz

- ✓ 比較同側 **氣導AC**和 **骨導BC** 檢查方法
- ✓ **先測骨導**，當聽不到音叉聲時，立即測同側氣導聽力，也可反之。

Rinne test 骨氣導比較

512Hz

• 骨導聽力: 音叉底部

• 氣導聽力

AC > BC : 聽力 正常 或感音神經性聽力障礙

眼睛檢查

分例行性檢查及**眼睛疾病的檢查**

○由健檢醫師檢查

- 檢查用具：小手電筒(亮度)、遮眼板(手掌?)

斜
視
眼
位
檢
查

角膜光照反射法(Hirschberg Test):

用手電筒照射受檢者的眼睛，誘導他的眼睛注視燈光

交替遮眼法(Cover Test):

1. 使用一遮眼板，先遮住受檢者任一眼，要他注視著你的鼻子
2. 很快的把遮眼板由一眼移到另一眼

其他眼部異常檢查

- 充足照明輔助下 （可使用小手電筒）
以視診方式檢查有無眼部其他異常
 - ① 睫毛倒插（下眼皮處）
 - ② 眼瞼下垂（先天性）
 - ③ 眼球震顫
 - ④ 其他異常現象（包括眼瞼、淚器、結膜、鞏膜等）

眼部檢查示範

辨色力檢查

109編修/104色盲

- 以石原氏綜合色盲檢查本
- 在自然光下請受檢者一一念出
- 注意事項：每一頁檢測項目不同

辨色力檢查

109編修/104色盲

石原氏綜合色盲檢查本

在自然光下一一念出

每一頁檢測項目不同

正常:12
色盲:12

正常:6
色盲:5

正常:15
色盲:17

正常:45
色盲:無法

正常:7
色盲:無法

正常:無法
色盲:5

耳鼻喉科檢查

- 用具：512音叉、頭鏡或手電筒
(立燈)、耳鏡及壓舌板
- 聽力檢查
- 耳鼻喉檢查：先視診及觸診再問診
- 構音(視情況)

耳鼻喉科檢查

耳鼻喉檢查

- 檢查方法：
 - 以**視診**檢查耳朵外觀
 - 以**觸診**觸摸耳後乳突
 - 以**耳鏡**檢查耳道內
- 注意事項：
 - 動作**溫和**
 - 耳朵**往上往後拉**
 - 頭轉向對側
- 每位學生檢查後，應清潔耳鏡套

頭頸部檢查

- 檢查項目：以視診、觸診檢查學生是否斜頸、甲狀腺/扁桃腺腫塊及其他異常。
- 檢查姿勢：面向+坐姿
- 檢查方法：
 - 視診對稱性及任何腫塊→吞嚥口水。
 - 觸診：依序摸淋巴腺(雙手的食指、中指、無名指指腹環狀觸摸)耳前、耳後、枕部、扁桃腺
 - 請學生轉頭，下巴與肩線平行，並以手觸摸

頭頸部檢查動作示範

胸部檢查

~胸腔及外觀~

- 檢查項目：脈搏、心音、呼吸聲檢查、胸廓異常及其他疾病。
- 需徵求家長同意
- 檢查用具：聽診器、屏風或遮簾（心音心電圖設備輔助）。
- 檢查方法：視診、觸診、聽診

胸廓及呼吸系統檢查

- **視診：左右對稱**，有無異常之突出或凹陷
- **深呼吸**，觀察胸廓活動是否正常
- 呼吸型態：速率、節律、深度及費力程度
- 以**聽診器檢查**是否有不正常呼吸聲、哮喘等。
 - **聽診位置：前胸與後胸**

胸部檢查～胸廓異常

漏斗胸

胸壁內凹、或俗稱漏斗胸，最常見之胸廓畸形，肋骨與肋軟骨生長不正常所致，前胸廓生長異常，呈現對稱或不對稱向內凹陷。此情形可能會壓迫心臟極大血管而造成心雜音。

胸部檢查～胸廓異常

雞胸

前胸骨往前凸出，造成前後徑加長，狀如雞的前胸般凸出

桶狀胸

前後徑增加，為肺部通氣過渡緣故，常見於正常老化及阻塞性肺部疾病

心音檢查

- 檢查方法
 - 安靜10分鐘：血壓、脈搏(規則與否)
 - 以聽診器診察心尖、左胸骨沿、主動脈及肺動脈位置之心音。
- 檢查姿勢：以坐姿方式，必要時讓學生仰臥，以視診觀察心尖搏動位置
- 檢查距離：應保持距離一大步（約90公分）

休息 5~10 分鐘
再次檢測

血壓心跳偏高

心音檢查位置

1. 主動脈區：胸骨右緣第二肋間
2. 肺動脈區：胸骨左緣第二肋間
3. 三尖瓣區：胸骨右緣第四、第五肋間（胸骨下端近劍突軟骨處）
4. 二尖瓣區：左鎖骨中線第五肋間內側（即心尖部）

檢查動作示範

示範

腹部檢查

- 項目：肝脾腫大及其他異常。
- 用具：聽診器，最好能備置檢查床、屏風或遮簾。
- 方法：問診→→觸診、扣診+視診
- 高雄市招標規範：學生應平躺於診療床仰臥進行腹部觸診及扣診，檢查肝脾腫大及異常隆起或腫塊情形。
- 肝臟檢查、脾臟檢查、腹部
- 疑似異常應躺臥檢查床(手冊)

脊柱四肢檢查

- 項目：脊柱側彎、多併指、蹲踞困難（108編修前青蛙肢）、關節變形、水腫及其他異常。
- 脊柱側彎檢查、四肢檢查
- 檢查方法：視診、觸診、[Adam前彎測驗](#)、[四肢及關節活動評估](#)

脊柱側彎檢查

- ✓醫師高度
- ✓位置
- ✓鞋襪

- 請學生脫去厚重外衣，適宜穿著運動服。
- 學生背向檢查者，雙腳併攏直立，兩手自然下垂，兩眼平視正前方；檢查者觀察學生左右耳朵是否等高、兩肩是否等高、兩側肩胛骨位置是否對稱、脊柱是否側彎、骨盆位置或腰部是否對稱。
- Adam前彎測驗，請學生向前彎腰至90度，兩臂下垂合掌，檢查者站立在受檢者後方，從背後目測學生的左右背部是否對稱等高，並觸診脊柱，注意任何不對稱的隆起，隆起的一端通常是脊柱側彎彎向的一方。

脊柱側彎 scoliosis 脊柱側彎檢查示範

- 結構性：發生於脊柱體本身的問題，會有代償性曲度矯正，前彎時使畸形變的更明顯。
- 功能性：例長短腳(不影響到胸廓)、姿勢不良(尤其是習慣彎腰駝背坐於桌前的人)，因此向前彎時其脊柱側彎會消失

示範二

左右肩峰鎖骨關節是否等高

左右腸骨前上棘等高

左右膝等高

皮膚檢查

- 檢查內容：包含癬、痣、紫斑、疥瘡、異位性皮膚炎、濕疹、血管瘤、黑色棘皮症及其他
- 檢查方法：視診、觸診、問診
- 檢查用具**：可佐以放大鏡、手電筒
- 檢查部位
 - 上肢部位：手肘、手心、手指、肘關節處
 - 下肢部位：大腿、小腿、足背、腳趾、足底、膝蓋內側
 - 軀幹部位：頭臉、頸、胸、腹、背部、臀部、腹股溝及其他
- 檢查方法**：請學生**面向檢查者坐著**，簡單的**病史詢問後**，以**視診或觸診**檢查是否有下列異常現象

黑色棘皮症

- 多發於皮膚褶皺處，如腋下、頸領、股溝、外陰道，患處會呈現暗黑、污褐色、灰色、斑塊狀、色素沉著，伴有絨毛狀、乳頭瘤狀、雞冠皮皺褶狀的凸起、增生、皮損，因為患處呈暗黑斑狀、圈裝或帶狀分佈皮膚褶皺間，常被誤認為「洗不乾淨」。

四肢檢查

- 請學生脫鞋脫襪，面向檢查者直立，觀察學童四肢是否相稱，有無畸型
- 觀察(視診)學生四肢是否相稱，有無畸型、長短腿、多併指或關節變形。
- 使學生兩手水平前伸，作蹲下起立、兩腿輪流單腳站立、以腳尖站立及以腳跟站立等動作，觀察下肢肌力及平衡。

下肢問題

- **扁平足**：縱向弓變平，腳掌觸及地面(站立時測試較準)，運動或活動時易造成腳掌腳踝的疲勞、疼痛。
- **蹲踞困難**：臀大肌、股四頭肌等萎縮或纖維化。背部肌肉代償作用因此容易後背酸痛。雙腳膝蓋無法併攏蹲下，否則會跌倒。

口腔檢查

檢查方法：以直接目視篩檢法為主需口鏡及簡單之輔助光源

(一) 未治療齲齒：

-基本原則：「當有所懷疑時，儘量採取保守原則」

(二) 已治療齲齒：

-決定於是否存在有：填補物、贗復牙冠，以及因齲齒遭拔除的牙齒狀況。

-恆牙及乳牙均同時列入考量。

(三) 恆牙第一大臼齒齲齒經驗

(四) 恆牙白齒之窩溝封填：乳白及透明

(五) 口腔黏膜異常：

口腔頰側黏膜(↑2周)及嘴唇四周等異常之顏色附著及潰瘍傷口

口腔檢查

檢查項目：包含齲齒檢查(104蛀牙)、缺牙、咬合不正、口腔衛生不良及其他牙齒健康問題

檢查項目 年齡層	未治療 齲齒	已治療 齲齒	恆牙第一 大白齒 齲齒經驗	恆牙白 齒之窩 溝封填	口腔黏 膜異常
國小 (約6、10歲)	○	○	○	○	-
國中 (約13歲)	○	○	○	-	○

檢查用具：口罩、手套、拋棄式口鏡、
檢查照明用燈（小型手電筒或頭燈）

口腔衛生不良、牙結石 口腔黏膜異常、牙周疾病等檢查

- 口腔衛生不良：以**目測**檢查牙齒表面及其牙縫
- 牙結石：**目測**即可發現牙結石。①長久的口腔衛生不良、②口水分泌不足、③刷牙方法錯誤→易產生牙菌斑→鈣化成為牙結石堆積。
- 牙周疾病：以**目測及詢問方式**檢查牙齦是否變紅、腫起、流血及有酸痛症狀。必要時宜**配合使用牙周探針**
- 齒列咬合不正：**目測**檢查排列或上下咬合的動作

泌尿生殖器檢查

- **檢查項目**：隱睪、包皮異常、精索靜脈曲張、陰囊腫大及其他異常。
- **適用對象**：一、四、七年級男生；一年級檢查需檢查隱睪，餘可視狀況
- **檢查用具**：**須更換手套**、**隱密環境**/屏風及手電筒。
- **檢查方法**：請學生面向檢查者站著，以**視診或觸診**檢查。

隱睪檢查

1. 在陰囊中，兩側大小差不多
2. 如僅摸到一側或兩側都摸不到睪丸，可能有隱睪
3. 影響：
 - ①因溫度較高，影響睪丸發育
 - ②日後產生惡性腫瘤的機會較高
 - ③在腹股溝較容易受傷或扭轉
4. 收縮性睪丸(retractile)其睪丸平常在正常位置，遇冷或其他刺激使提睪肌收縮時，把睪丸從陰囊拉到腹股溝，刺激消失時睪丸就恢復正常位置。這現象不必治療，年齡較大就會改善

尿道出口及包皮異常檢查

- 尿道出口異常：如尿道下裂者，尿道的開口不在龜頭的頂端，而是在陰莖的腹側方。
 - 請學生採站立姿勢，以視診檢查
- 包皮異常：請學生採站立姿勢，檢查者以視診檢查包皮是否完全覆蓋龜頭。
 - ∞包皮過長：指龜頭部份完全被包皮覆蓋
 - ∞包莖現象：包莖係指包皮末端緊束，而無法將至退到陰莖的冠狀溝以上
 - ∞檢查者戴手套撥動，仍無法露出龜頭，有包莖現象
 - ∞須提醒其注意清潔，並轉介泌尿科進一步處理。

陰囊水腫及精索靜脈曲張檢查

- 陰囊水腫：睪丸四周包圍著一個像水袋的囊腫。
 - 觸診**可感覺到陰囊腫大而有彈性
 - 用**手電筒抵住陰囊照射**，則會產生透光現象
- 精索靜脈曲張：請學生採站立姿勢，**以手觸診**，檢查睪丸上方是否有腫脹的血管。
 - ∞患側陰囊可摸到或看到如蚯蚓般鼓脹扭曲的靜脈血管，好像「包著一袋蟲」(a bag of worm)
 - grade 1 的精索靜脈曲張，患者腹部用力時才能觸摸到
 - grade 2 腹部不需用力即能觸摸到
 - grade 3 肉眼即可看出

血壓檢查

- 檢查注意事項：宜休息5~10分後檢查。
- 壓脈帶選擇：配合學童上臂臂圍大小的壓脈帶
氣囊寬度、氣囊長度（cm）

表 1 血壓計壓脈帶氣囊寬度對照表

上臂圍（上臂中段）	氣囊寬度	氣囊長度
6-15 cm	5	15
16-21 cm	8	21
22-26 cm	10	24
27-34 cm	13	30

心電圖檢查 (視學生狀況辦理)

檢查環境：檢查處區隔，隱密空間，學生之間應有間隔

檢查姿勢：並備有檢查床，臥姿

注意：宜休息5~10分後檢查。

項目	內容	檢查對象	檢查方法	檢查用具	檢查人員
例行性檢查					
	辨色力	一四七年級	色覺檢查	石原氏綜合色盲檢查本	健檢醫師

檢查人員

完成時間

健康檢查工作前完成並登錄於健康檢查紀錄卡上

教育部
增強觀察員之專業及檢核細膩性

辨色力以石原氏綜合色盲檢查本檢查，**檢查地點光線是否明亮**

眼睛	斜視、弱視、其他異常	一四年級	角膜光照反射法、視診	小手電筒、遮眼板	健檢醫師
頭頸	斜頸、異常腫塊及其他	一四年級	視診、觸診		健檢醫師
耳鼻	聽力	一四七年級	音叉檢查法 耳機式檢查法	512Hz 音叉 耳機式聽力檢測器	健檢醫師
喉	耳道畸形	一四七年級	視診、觸診	頭鏡、耳鏡、手電筒、壓舌板、燈光	健檢醫師
	耳膜破損、盯聾栓塞、扁桃腺腫大及其他異常	一四七年級	視診		健檢醫師

檢查對象：一、四、(七)

檢查方法/用具

檢查人員：健檢醫師

教育部

增強觀察員之專業及檢核細膩性

聽力檢查是否符合規定、應
停留於後腦時間、是否規劃
靜**不受噪音干擾**的場所

教育部

增強觀察員之專業及檢核細膩性

檢查時學生會共用之器材，應於前一學生使用後確實消毒；醫師手部應於接觸學生身體後消毒、或是接觸後之手套應更換。

胸腔及外觀檢查	心肺疾病、胸廓異常及其他異常 心電圖	一四七年級 一年級	視診、觸診、聽診 儀器判讀	聽診器、屏風 心電圖儀器	健檢醫師 健檢醫檢師
腹部	異常腫大及其他異常	一四七年級	視診、觸診、扣診		健檢醫師
脊柱四肢	脊柱側彎、肢體畸形、青蛙肢及其他異常	一四七年級	視診、觸診、Adam 前彎測驗、四肢及關節活動評估		健檢醫師
泌尿	隱辜	適用於全部一四年級男生	視診、觸診	手套更改、屏風	健檢醫師

檢查對象：一、（四、七）

檢查方法/用具

檢查人員：健檢醫師

教育部

增強觀察員之專業及檢核細膩性

如胸部檢查之**聽音秒數**、**聽音點**
男學生隱辜情形是否落實檢查

生殖	包皮異常、精索靜脈曲張及其他異常	適用於全部一四七年級男生	視診、觸診	手套更改、屏風	健檢醫師
皮膚	癬、疥瘡、疣、異位性皮膚炎、溼疹及其他異常	一四七年級	視診、觸診		健檢醫師
口腔	未治療齲齒、已治療齲齒、恆牙第一大白齒齲齒經驗、恆牙白齒之窩溝封填	一四年級	視診	頭鏡、探針、口鏡、燈光、手套	牙醫師
	未治療齲齒、已治療齲齒、恆牙第一大白齒齲齒經驗、恆牙白齒之窩溝封填、 口腔黏膜異常	七年級			

教育部
增強觀察員之專業及檢核細膩性

檢查對象：一、（四、七）

檢查方法/用具

檢查人員：健檢醫師

身體診查是否確實**觀察皮膚狀況**

學生會共用之器材：**使用後確實消毒**；或**手套應更換**。

口腔牙齒檢查器材：**使用一人一個口鏡應更換**。

實施原則-醫院端

檢查後

- ◆補檢安排(規定時程)
- ◆報告發予(規定時程)
 - ◆工作天與日曆天區別

個人報告：家長書面通知

學校報告：總表、異常、統計分析

匯入健康資訊系統SSHIS格式

檢查結果正確率之計算

- 學校依受檢學生數之1%比率**重複收取尿液、血液**
- 編寫代號(個案資料需留校)，將**資料併入受檢名冊中**送交承辦單位進行實驗室檢查。
- **對照檢查結果**：檢驗結果不符者之比率不得超過複製樣本數之3%。

學生健檢態樣討論-1

- ◆補檢：學校**確時主動**控管“補檢”日期
 - ◆檢體收取時段：請確實做到**守時原則**，否則會波及後續約定收送學校檢體（紀錄之）
-
- **和議行為**或自行決定的事件，請留意，在驗收單張闡述，只讓自己處於不利情勢。
 - 非招標規範訂定項目，不能要求廠商配合。

健檢態樣討論-2

- 現場如有狀況，即刻與醫院負責人**反映**，必要時先停止受檢或調整受檢人數
 - 讓問題於**現場解決**，事後驗收闡述只能亡羊補牢
 - **整數計算**：1組的人力計算，無1.5組方式計算。
-
- 留下紀錄；文字紀載，**必要時拍照或攝影**
 - 驗收單：**務必**闡述量化、文字及時間點描繪，才能有效執行扣款機制
 - 場地佈置：**校方要主動積極**，對動線安排要清處、進出條理

學生健康檢查 觀察員評值表

評值表七大項目

一 基本資料
二 行政執行情況

三 核對檢查工作隊人力配置與分工
四 檢查項目分站觀察
五 檢查人員配備

六 檢查項目執行情形
七 觀察者綜合意見

一、基本資料

- 填寫學校及年級
- 觀察日期及承辦醫院
- 應檢查人數
- 檢查地點
- 學生健檢工作時間

二、行政執行情形

三、檢查動線安排

四 檢查項目分站觀察

1、檢查站設置

- 肢體
- 牙科

1、檢查站設置

- 內科
- 家醫

2、檢查站標示

檢查站
有立標示牌

2、檢查站標示

標示牌上
註明
檢查項目

四 檢查項目分站觀察

四、檢查項目分站觀察

(附表4)全身性理學健康檢查流程圖 (請各校視校內場地狀況調整)

五 檢查人員配備

主任

組長

老師

家長

志工

校護

其他

五、檢查項目執行情況

- ? 口腔
- ? 眼科
- ? 耳鼻喉

- ? 頭頸部
- ? 皮膚
- ? 胸部

- ? 腹部
- ? 脊柱四肢
- ? 泌尿生殖器檢查

- ? 總評
- ? 其他增列項目

六、觀察者綜合意見

總評工作方法

檢查通知單注意項目
通知單資訊
檢查結果及複檢科別
分發衛教單張

工作人員態度

- 非常良好
- 良好

六、觀察者綜合意見

⑩ 學校與承辦醫院之優點與缺點

⑩ 整體評值

⑩ 其他意見(學校給觀察員的意見)

◎ 感恩各觀察員的用心 因為您們~ 讓學生的健檢更有保障

THANK YOU