

115 年度臺中市政府所屬機關及學校護理人員
暨公立幼兒園契約進用護理人員聯合甄選
學校衛生護理學與公共衛生護理學科

讀完本頁的說明，聽從監試委員的指示才開始作答

※請先確認你的答案卡、准考證與座位號碼是否一致無誤。

請閱讀以下測驗作答說明

測驗說明：

115 年度臺中市政府所屬機關及學校護理人員暨公立幼兒園契約進用護理人員聯合甄選，學校衛生護理學與公共衛生護理學題本，題本採雙面印刷，共 80 題，測驗時間 90 分鐘，作答開始與結束請聽從監試委員的指示。

注意事項：

1. 所有試題均為四選一的選擇題，答錯不倒扣。
2. 依試場規則規定，答案卡上不得書寫姓名及任何標記。故意污損答案卡、損壞試題本，或在答案卡上顯示自己身份者，該科測驗不予計分。

作答方式：

請依照題意從四個選項中選出一個正確或最佳的答案，並用 2B 鉛筆在答案卡上相應的位置劃記，請務必將選項塗黑、塗滿。如果需要修改答案，請使用橡皮擦擦拭乾淨，重新塗黑答案。

請聽到鈴（鐘）聲響後再翻頁作答

試題公告
僅供參考

選擇題（共 80 題，每題 1.25 分，共 100 分，答錯不倒扣）

1. 關於學校垃圾處理原則中垃圾減量，下列敘述何項錯誤？
(A)Recovery:重視維修保養，延長物品使用壽命
(B)Reduce:減少丟棄之垃圾量
(C)Reuse:重複使用容器或產品
(D)Refuse:拒用無環保概念產品
2. 依據「學校衛生法」之規定，本法所稱中央主管機關為以下何者？
(A)教育部 (B)衛生福利部 (C)衛生所 (D)各縣市政府
3. 臺中市某校辦理健康檢查後，護理師整理學生健康資料，下列處理何者正確？
(A)健康檢查結果應載入學生資料，為保護其個資不得隨學籍轉移
(B)健康資料屬醫療院所資料，學校不得留存任何檢查結果
(C)健康檢查及疾病檢查結果應載入學生資料，併隨學籍轉移，且學生資料應予保密
(D)導師基於班級經營需要，可自由查閱全班健康檢查結果
4. 社區護理師為了篩檢出慢性病高危險群，需選擇良好工具，用來區分有病與無病者。關於篩檢工具的敘述，下列何者最不適當？
(A)敏感度高，表示篩檢工具較能找出真正有病的人
(B)特異性高，表示篩檢工具較容易出現偽陽性結果
(C)偽陽性是指實際沒有疾病，卻被篩檢判定為陽性
(D)偽陰性是指實際有疾病，卻被篩檢判定為陰性
5. 校護或衛生所護理師因業務知悉疑似麻疹或其他傳染病個案資料，下列何者正確？
(A)可於防疫必要範圍內提供相關人員所需資訊，但不得任意揭露個案姓名、病歷、病史等資料
(B)若個案尚未確診，為提醒接觸者注意，可先於班級群組公布其姓名及活動史
(C)為利學校掌握暴露情形，可提供個案姓名，請相關班級自主回報接觸史
(D)只要未對外發布新聞，將個案姓名與病史提供給校內群組討論，原則上不屬於洩漏
6. 某學生返國後發燒、咳嗽、結膜炎、出疹，且曾與疑似麻疹個案同處候診區。校方進行接觸者追蹤與衛教時，下列何者正確？
(A)接觸者72小時內未發燒或出疹，即可解除健康監測
(B)麻疹潛伏期約7~18天，少數可達21天；追蹤期間出現疑似症狀應通報
(C)麻疹主要於出疹後才具傳染力，接觸者追蹤可自出疹後開始
(D)接觸者若曾接種一劑 MMR 疫苗，無症狀時即不需健康監測
7. 社區護理師分析某地區生命統計資料時，發現該地區孕產婦死亡率偏高，因此進一步評估孕產婦產前檢查、產時照護及產後照護品質。關於各項死亡率指標的意義，下列何者最適當？
(A)原因別死亡率主要用來評估產前檢查是否完善
(B)孕產婦死亡率可反映孕產婦產前、產時及產後照護品質
(C)新生兒死亡率主要用來反映中老年慢性病照護品質
(D)嬰兒死亡率僅能反映醫院急診照護品質

8. 某衛生所護理師欲推動社區健康營造。社區健康營造需先了解社區問題與需求，再凝聚居民共識，進一步建立社區組織網絡，最後擴大居民參與。下列步驟的正確順序為何？
①強化社區組織，建立社區組織網絡 ②喚起共同參與興趣，擴大活動影響層面 ③找出健康議題 ④凝聚社區共識
(A)③④①② (B)④③①② (C)③①④② (D)①③④②
9. 民眾向臺中市衛生所護理師詢問如何申請長照服務，下列何者正確？
(A)由衛生所護理師直接核定長照等級後會立即派案
(B)可撥打1966、聯絡當地照管中心、住院期間聯絡出院準備銜接長照服務小組或線上申請
(C)只能由醫院醫師開立診斷書後直接向居服單位申請，不再經照管中心評估
(D)若已聘僱外籍看護工，即不得申請任何長照服務
10. 臺中市某家庭已聘僱外籍家庭看護工照顧失能長者，家屬詢問衛生所是否仍可使用長照資源。依衛福部長照專區說明，若被照顧者經評估為長照需要等級第2級含以上，可使用下列哪些服務？①專業服務 ②交通接送服務 ③輔具及居家無障礙環境改善服務 ④喘息服務
(A)①② (B)①③ (C)②③④ (D)①②③④
11. 某國小推動健康促進學校計畫，欲從學校整體層面營造健康校園。依健康促進學校的六大範疇，下列哪些屬於其範疇？①學校衛生政策 ②學校物質環境 ③學校社會環境 ④學校健康資料 ⑤個人健康技能 ⑥保健室經營績效
(A)①②③⑤ (B)①②④⑥ (C)②③④⑤ (D)①③⑤⑥
12. 某班學生常表示附近市場拍賣活動太吵，上課無法專心，學校護理師協助進行教室噪音評估。一般教室內音量宜控制在多少分貝以下，以免影響學生聽課效率？
(A)30分貝 (B)50分貝 (C)85分貝 (D)100分貝
13. 社區護理師辦理成人慢性病篩檢。48歲林女士檢查結果如下：腰圍80公分、血壓129/85 mmHg、空腹血糖99 mg/dL、三酸甘油酯151 mg/dL、HDL-C 60 mg/dL。依臺灣代謝症候群判定標準，下列哪些項目已達異常標準？①腰圍80公分 ②收縮壓129mmHg ③舒張壓85mmHg ④空腹血糖99mg/dL ⑤三酸甘油酯151mg/dL ⑥HDL-C 60mg/dL
(A)①③⑤ (B)①②⑤ (C)②③④ (D)③⑤⑥
14. 學校護理師協助體位控制班學生設定健康目標。某學生表示：「我知道運動有好處，但覺得自己常常沒時間，也擔心做不到。」護理師協助學生訂定每週運動3次、每次20分鐘的具體計畫，並討論可行的時間安排。此作法最能提升下列哪一項？
(A)自覺嚴重性 (B)自我效能
(C)自覺罹患性 (D)行動障礙
15. 學校護理師設計腸病毒防治宣導，在洗手台、教室門口張貼提醒標語，並由水果姊姊擔任防疫小天使，拍宣傳廣告提醒學生要洗手。依健康信念模式，此策略最符合哪一項概念？
(A)自覺罹患性 (B)行動線索
(C)自覺障礙性 (D)疾病嚴重性

16. 某COVID-19快篩工具之敏感度為87%。其代表意義為何？
(A)篩檢陽性者中，有87%真正罹患COVID-19
(B)真正罹患COVID-19者中，有87%篩檢結果為陽性
(C)真正罹患COVID-19者中，有87%篩檢結果為陰性
(D)篩檢陰性者中，有87%沒有罹患COVID-19
17. 漢他病毒肺症候群統計資料顯示，確診病例中約35%至50%會死亡。此 35%至 50%最適
合稱為下列何種流行病學指標？
(A)死亡率 (B)致死率 (C)原因別死亡率 (D)相對危險性
18. 有關登革熱之敘述，下列何者正確？
(A)感染任一型登革病毒後，即可對所有血清型產生終身免疫
(B)登革熱主要透過空氣飛沫在人與人之間傳播
(C)登革病毒共有四種血清型，重複感染不同型別可能增加重症風險
(D)登革熱確診後皆需立即使用抗病毒藥物治療
19. 某位罹患糖尿病之學生，學校護理師進行個案管理。下列哪項「不是」必要考量？
(A)了解學生用藥、飲食及血糖監測情形
(B)指導學生及相關照護人員高、低血糖處理方法
(C)一律協調減少體育課時數，以避免血糖波動
(D)與家長、導師及必要人員建立緊急處理流程
20. 學校衛生護理師推動學童餐後潔牙計畫，下列哪些作法最能「增強」孩童持續刷牙的意
願？ ①邀請牙醫到校說明口腔保健 ②於校園公告處張貼口腔衛生海報 ③家長讚賞
孩子餐後正確刷牙 ④老師給予確實刷牙者獎勵點數
(A)①② (B)②③ (C)③④ (D)①④
21. 社區衛生護理師進行走街評估，觀察防火巷是否通暢、滅火器及消防栓是否可使用，主
要是為了解社區哪一層面？
(A)溝通系統 (B)經濟狀況 (C)安全系統 (D)福利系統
22. 某國小多名學生校外教學在食用餐盒後出現噁心、嘔吐及腹痛等症狀。衛生單位調查後
懷疑與未完全煮熟的蛋類食品有關，並考慮可能為沙門氏桿菌感染。關於沙門氏菌的敘
述，下列何者最「不適當」？
(A)避免食用未經煮熟的蛋類製品 (B)治療以補充水分及電解質為主
(C)感染症狀為腸胃症狀 (D)潛伏期平均為72~96小時
23. 社區衛生護理師家訪時，想了解某家庭與鄰里、學校、醫療院所及社福資源的互動關係。
最適合使用下列哪一評估工具？
(A)家庭社會關係圖 (B)家庭圈圖
(C)家庭發展史 (D)APGAR 家庭功能評估表
24. 林小姐在護理師建議下改變生活型態，戒掉含糖飲料並固定每週運動三次，至今已超過
8 個月。她表示偶爾仍想喝甜飲，但能克制，且運動已成為習慣。依跨理論模式判斷，
最可能處於哪一階段？
(A)意圖期 (B)準備期 (C)行動期 (D)維持期

25. 根據世界衛生組織的定義，我國目前已邁入超高齡的社會，以下敘述何者為是？
(A)65歲以上人口達14% 即為超高齡社會
(B)2025年我國65歲以上人口占總人口之比率為15.06%
(C)台灣目前約每五人就有一位是老年人口
(D)扶養比指標的分子為老年人口數
26. 以下何者是我國法定傳染病分類之主要依據？ ①疾病的發生率 ②疾病傳播途徑 ③疾病的病原體 ④疾病的死亡率 ⑤疾病的致死率 ⑥疾病傳播速度
(A)①②③ (B)①③④ (C)①④⑤ (D)①⑤⑥
27. 在台灣如國人有感染漢他病毒，依其臨床症狀及病程可區分成那些症候群，且其為法定傳染病的第幾類？ ①出血熱併腎症候群 ②出血熱併肝症候群 ③肺症候群 ④第二類 ⑤第三類
(A)①③④ (B)①③⑤ (C)②③④ (D)②③⑤
28. 根據勞動基準法規定，有子女未滿一歲必須親自哺乳的女性勞工，於休息時間外，雇主應每日另給哺乳時間幾次，且每次以多久為度？
(A)2次，15分鐘 (B)2次，30分鐘 (C)3次，15分鐘 (D)3次，30分鐘
29. 國民健康署參考世界衛生組織(WHO)長者整合性照護指引(Integrated care for older people, ICOPE)理念，與地方政府合作推動預防及延緩長者失能照護方案，提供長者健康促進的整合式服務，並提供長者六大功能之評估工具，以了解方案的介入成效，以下何者非為所評估的功能？
(A)書寫功能 (B)營養狀況 (C)視力 (D)聽力
30. 社區公共衛生護理工作的目的是促進社區整體健康，強調運用與社區形成夥伴關係的工作策略，以下敘述何者最適當？
(A)公衛護理人員評估與設定社區健康議題，並指導社區夥伴推動健康促進計畫
(B)評估社區的健康狀態與問題，應以客觀可量化的測量工具做調查，且以調查多數主流族群為主，少數特殊族群的經驗訪談因不具代表性，可予以避免
(C)此策略強調過程中鼓勵民眾積極參與社區健康問題的設定，透過由下而上的決策過程，列出符合自己所處社區的問題與需要之優先順序
(D)社區護理人員須邀請社區外的健康專家，擔任社區夥伴推動健康促進計畫的指導者
31. 衛生醫療機構儲存疫苗，應遵守疫苗冷儲溫度監控原則，以下敘述何者最正確？
(A)每日至少1次執行查核記錄冰箱之溫度狀況
(B)確實監測及掌握冰箱各層各區冷儲溫度範圍，確認冷儲溫度範圍維持在8°C
(C)每日查核記錄溫度或取用疫苗時，如發現溫度異常或溫度監視片異常變色、冷凍片破裂，應停用並立即銷毀疫苗
(D)每日查核記錄冰箱之溫度狀況事項包括高低溫度計及記錄溫度、溫度監視片指數、冷凍監視片等
32. 以下何者不屬於推動高齡友善城市的八大面向？
(A)口腔保健與義齒補助 (B)交通運輸
(C)工作與志願服務 (D)通訊與資訊

33. 為建構健康飲食支持環境，提升人民營養及健康飲食知能，增進人民健康，我國於113年公告實施「營養及健康飲食促進法」，此屬於1986年WHO渥太華憲章的健康促進行動綱領之哪一項？
- (A)創造支持性環境
(B)制定健康的公共政策
(C)強化社區行動
(D)發展個人技能
34. 某工廠的C作業環境區有些工人發生了甲狀腺功能異常現象，疑似因放射性碘污染所致，此時宜採取何項調查方法來確立此項關聯？
- (A)個案對照研究法 (B)個案追蹤調查法
(C)生態研究法 (D)實驗性研究法
35. 依據學校衛生法規定，學校對於患有下列何疾病的學生應加強輔導與照顧，必要時，得調整其課業及活動？ ①心臟病 ②肝炎 ③氣喘 ④肥胖症
- (A)①② (B)①③ (C)①②④ (D)①③④
36. 依據學校傳染病監視作業注意事項，幼兒園及高級中等以下各級學校如發現疑似傳染病應會同衛生、環境保護機關做好防疫及監控措施，應監測的項目包含哪些？ ①腹瀉 ②腸病毒 ③猴痘 ④紅眼症 ⑤發燒(耳溫 $\geq 38^{\circ}\text{C}$)
- (A)①②③⑤ (B)①②④⑤ (C)②③④ (D)②④⑤
37. 某社區衛生所辦理社區成人戒菸班，專業團隊為每位參加者規劃好戒菸行動方案，並擬啟動戒菸宣言，此時是運用跨理論模式中的哪一階段？
- (A)計畫期 (B)準備期 (C)行動期 (D)意圖期
38. 社區護理師接獲通報，社區中有位獨居老人疑似出現抑鬱症狀，請問應運用之護理策略及實施步驟依序為何？ ①居家訪視 ②實施心理評估 ③轉介至社區心理健康中心 ④收案追蹤管理 ⑤邀請其至社區關懷站參與活動
- (A)①②③④⑤ (B)①②③④ (C)①②③ (D)①③
39. 以下有關空氣品質指標(AQI)及其應用的敘述，何者不適當？
- (A)監測的污染物包含懸浮微粒(PM10)、細懸浮微粒(PM2.5)、臭氧(O3)
(B)AQI值顯示橘色等級，敏感性族群之師生應停止戶外活動，留在室內減少體力消耗
(C)AQI值顯示紫色等級，學校及幼兒園應全部立即停止戶外活動
(D)AQI值達超過200時，顯示空氣品質對所有人都可能產生較嚴重的健康影響
40. 一名患有血友病的國小四年級學生，在體育課進行桌球運動時不慎扭傷右側膝關節。學生來到健康中心時，主訴關節疼痛，且外觀已開始出現輕微腫脹。此時，校護為其執行急性運動傷害處置(R.I.C.E. 原則)，下列哪一項護理措施最不適當？
- (A)讓學生在健康中心臥床休息(Rest)，並限制右下肢不必要活動
(B)為了達到快速止痛與消腫的效果，立即給予局部熱敷(Ice/Heat)
(C)使用彈性繃帶進行適度加壓包紮(Compression)，以減緩關節腔腫脹
(D)抬高患肢(Elevation)，使其高於心臟位置，並盡速聯絡家長協助就醫

41. 某衛生所護理師欲規劃一項社區長者跌倒預防活動。在介入前，她透過戶政資料、健保資料庫及家戶訪問，收集並分析該社區過去一年內長者跌倒的發生率、高發地點、易跌倒時段，以及長者常見的慢性病與用藥情形。依據社區衛生護理實務流程，此步驟最屬於下列何者？
- (A)社區健康診斷 (Community Health Diagnosis)
(B)社區健康評估 (Community Health Assessment)
(C)社區健康計畫執行 (Community Health Implementation)
(D)社區健康計畫評價 (Community Health Evaluation)
42. 校護針對校內學童近視率逐年攀升之問題，欲依據衛生福利部與教育部推動之視力保健策略，從「物理與教學環境層面」進行系統性介入。下列哪一項措施最符合此範疇？
- (A)協調教務處與各班導師，落實課堂間「用眼 30 分鐘，休息 10 分鐘」的下課清空教室制度
(B)定期檢測教室黑板及學生書桌面的照度，並配合總務處進行燈管汰換與調整座位之個人化身高桌椅比對
(C)於健康中心開設「散瞳劑點藥遵從性」諮詢專線，並針對近視學童進行每週視力追蹤測量
(D)辦理校園學童「足夠戶外活動量 (天天戶外 120)」的集點獎勵競賽，鼓勵學生放學後多去公園
43. 衛生所護理師進行社區健康評估時，發現某偏遠鄉鎮的長者高血壓與糖尿病控制不合格率顯著高於都會區。深入調查發現，該區並非長者缺乏健康知識，而是因為社區內無高血壓/糖尿病專科診所、大眾運輸工具班次極少（每日僅兩班），導致長者常因「交通成本過高、就醫不便」而自行停藥。這類影響健康結果的因素，在公共衛生學上最屬於下列哪一範疇？
- (A)基因與生物學因素 (Genetic and Biological Factors)
(B)個人生活型態與健康行為 (Individual Lifestyle and Behaviors)
(C)健康的社會決定因素 (Social Determinants of Health, SDOH) 中的「醫療照護可及性與環境限制」
(D)臨床醫療技術的局限性 (Limitations of Medical Technology)
44. 依據《學校衛生法施行細則》第 11 條規定，國民小學一年級新生入學前應完成學齡前之各項預防接種。若新生的家長未能於入學前完成接種，學校護理人員最遲應於何時依法通知當地衛生機關進行補行接種？
- (A)開學後一週內 (B)開學後一個月內 (C)開學後一學期內 (D)開學後一年內
45. 萬里區社區衛生中心護理師在進行失智症高風險家庭篩檢時，發現陳爺爺（輕度認知障礙）與主要照顧者（長媳）皆出現明顯的照護焦慮。護理師除了主動協助陳爺爺轉介至當地的「瑞智學堂」以延緩認知功能退化外，亦積極媒合警政系統進入社區為長者進行「預防走失指紋捺印」，並引導長媳加入「失智症照顧者互助支持團體」以建構社會支持網絡。在此跨體系（醫療-警政-福利）的資源連結與整合過程中，社區護理師最核心體現了下列何種角色功能？

- (A)諮詢者 (Consultant)與代言人 (Advocate)
(B)個案管理者 (Case Manager)與協調者 (Coordinator)
(C)流行病學調查者 (Epidemiologist)與健康教育者 (Health Educator)
(D)環境改變者 (Environmental Change Agent)與研究者 (Researcher)
46. 有關兒童與青少年肥胖 (Childhood Obesity) 的健康管理與護理指導，下列敘述何者最為正確且符合臨床實證？
(A)兒童身體質量指數之建議值皆為18~24 (kg/m²)
(B)介入措施應優先採取熱量限制飲食法 (Hypocaloric diet)，要求學齡前兒童每日減重 0.5 公斤，以迅速降低長大後罹患代謝症候群的風險
(C)行為修正策略 (Behavior modification) 應強調以家庭為中心的行為改變，避免將高熱量食物作為獎懲誘因，並協助建立正向身體心像 (Body image)
(D)護理指導應著重於督促兒童建立每日獨立運動的習慣，家長的角色僅需扮演客觀的監督者與記錄者即可
47. 社區衛生護理人員對於由疫區入境的民眾，採取防疫措施與協助調查傳染病來源，是屬於哪一段預防工作？
(A)第一段預防 (B)第二段預防 (C)第三段預防 (D)第四段預防
48. 某4歲原住民族地區幼童接受牙齒塗氟後，家長詢問下次何時可再次接受政府補助塗氟服務。依現行政策，下列何者最適當？
(A)每1個月1次 (B)每2個月1次 (C)每3個月1次 (D)每6個月1次
49. 依據《學校衛生法》及學校衛生護理實務，關於學校護理師角色與功能之敘述，下列何者最不適當？
(A)辦理學生健康檢查及異常個案追蹤管理
(B)規劃校園健康促進活動，並結合家庭及社區資源
(C)提供校園緊急傷病處理及健康諮詢服務
(D)獨立負責校園食品安全稽查及裁罰作業
50. 某國中舉辦校外教學，返校後有2名學生出現視力模糊、吞嚥困難、口乾及肌肉無力等症狀，但無明顯發燒。校護詢問飲食史後，懷疑為肉毒桿菌毒素中毒。下列何種食品最可能為感染來源？
(A)未充分加熱之生魚片 (B)真空包裝且保存不當之香腸
(C)隔夜室溫放置之炒飯 (D)未經巴氏殺菌之鮮乳
51. 某高中近一年學生因焦慮及情緒困擾增加，校護辦理正念減壓、深呼吸技巧、情緒管理及壓力調適課程，提升學生自我照護能力。此措施最符合WHO健康促進五大行動綱領中的哪一項？
(A)建立健康公共政策 (Build Healthy Public Policy)
(B)創造支持性環境 (Create Supportive Environments)
(C)發展個人健康技能 (Develop Personal Skills)
(D)重新定位健康服務 (Reorient Health Services)

52. 某國小一年級導師發現近期校內學生發生多起跌倒及運動傷害事件，校護規劃「事故傷害防制教育」課程。下列衛教內容何者最不適當？
- (A)未滿2歲幼兒應優先使用後向式安全座椅，並依身高體重選擇適當座椅
 - (B)家庭為兒童燒燙傷最常發生的場所，應避免幼童接觸熱湯、熱水及電器
 - (C)1歲以下嬰兒常見事故傷害包括窒息、異物吸入及溺水
 - (D)隨著醫療進步，事故傷害已非我國兒童及青少年主要死因
53. 某高中發現一名學生確診肺結核，校護配合衛生單位辦理校園肺結核防治衛教。下列措施何者最符合第一級預防（Primary Prevention）？
- (A)協助疑似個案接受胸部X光及痰液檢查
 - (B)宣導教室保持良好通風、咳嗽禮節及正確佩戴口罩
 - (C)督導確診學生規則服用抗結核藥物並完成治療
 - (D)追蹤治療後副作用及預防抗藥性肺結核
54. 依據《學校衛生法》規定，某國小設有45班，下列有關學校衛生人力配置之敘述，何者最符合現行規定？
- (A)應配置護理人員1名，營養師1名
 - (B)應配置護理人員2名，營養師1名
 - (C)應配置護理人員2名，營養師2名
 - (D)應配置護理人員1名，營養師2名
55. 校護規劃一年級學生洗手教育，目標為建立正確洗手技能。下列何種健康教育方法最能達成此學習目標？
- (A)團體討論
 - (B)專題演講
 - (C)示範教學結合實際演練
 - (D)發放衛教手冊
56. 某國小校護分析學生健康資料，發現下列健康問題。依據疾病嚴重性、傳播風險及校園公共衛生原則，目前最應優先處理的是哪一項？
- (A)健康檢查結果顯示，全校65%學生有視力不良
 - (B)全校18%學生屬過重或肥胖
 - (C)當日有10名學生因疑似腸病毒群聚感染請假，且來自同一年級
 - (D)全校25%學生有齲齒問題
57. 某校護分析近三年學生健康檢查資料，發現肥胖率及視力不良率逐年上升，並依分析結果規劃健康促進介入措施。上述作法最能展現流行病學的哪一項功能？
- (A)健康問題監測及健康需求評估
 - (B)教學設備管理
 - (C)學校財務規劃
 - (D)行政採購管理
58. 某國小校護使用室內空氣品質監測設備，發現某間教室二氧化碳（CO₂）濃度持續超過1,000 ppm。此時最適當的處置為何？
- (A)關閉門窗，以避免室外污染物進入教室
 - (B)加強教室通風或啟動機械換氣設備，改善室內空氣品質
 - (C)僅提醒學生多喝水即可，不需調整教室環境
 - (D)二氧化碳濃度僅影響植物生長，對學生健康無影響

59. 某國小校護整理一年級新生健康檢查資料後，依健康管理原則，下列何者應優先追蹤？
(A)視力正常，但BMI偏高0.3 kg/m²
(B)尿液檢查蛋白尿陽性且複檢未完成
(C)身高低於同年齡平均值
(D)乳牙齲齒已完成治療
60. 某校護比較兩種脊柱側彎篩檢工具：工具A：敏感度95%，特異性70%；工具B：敏感度80%，特異性95%，若篩檢目的為早期發現疑似個案，避免漏診，下列何者最適合作為第一線篩檢工具？
(A)工具A (B)工具B (C)兩者皆可 (D)無法判斷
61. 某社區護理師發現遊民因缺乏醫療保險及社會支持，未能獲得適當健康照護，因此除辦理健康篩檢外，亦透過新聞媒體、社群平台及公聽會倡議改善弱勢族群健康權益，促使地方政府增加照護資源。上述最能展現社區護理師的哪一項專業角色？
(A)組織動員者 (Organizer) (B)代言者 (Advocate)
(C)協調者 (Coordinator) (D)健康需求評估者 (Assessor)
62. 某國小推動「健康體位促進計畫」，內容包括改善營養午餐菜單、增加身體活動課程及健康飲食教育，期望降低學生過重與肥胖比例。若欲評估計畫成果評價 (Outcome Evaluation)，下列何者最適合作為評值指標？
(A)營養午餐供餐達成率 (B)學生參與健康飲食課程的人數
(C)家長對營養午餐的滿意度 (D)學生過重及肥胖盛行率的變化
63. 有關WHO提出之長者整合性照護指引 (ICOPE)，下列敘述何者最正確？
(A)ICOPE主要目的為早期發現內在能力 (Intrinsic Capacity) 下降，以延緩失能並促進健康老化
(B)ICOPE主要評估慢性疾病數目及共病情形
(C)ICOPE主要評估日常生活活動 (ADL) 是否完全獨立
(D)ICOPE適用於失能長者，不適用於健康社區老人
64. 某國小校護進行校園健康環境評估時，發現下列環境危害。依環境衛生分類，何者不屬於物理性危害 (Physical hazards)？
(A)教室噪音長期超過建議值，影響學生學習
(B)夏季教室溫度過高，造成熱傷害風險增加
(C)校園附近土壤遭重金屬污染
(D)X光設備產生之游離輻射暴露
65. 某國小發現校內部分飲水設備鉛含量超過飲用水標準，校護立即配合學校進行健康風險評估。下列何者最不適當？
(A)兒童因神經系統尚未發育成熟，較成人更容易受到鉛暴露影響
(B)應立即停止使用受污染飲水設備，並提供安全飲用水
(C)將受污染飲用水煮沸後即可安全飲用，因高溫可去除鉛
(D)長期鉛暴露可能影響兒童認知發展、注意力及學習能力

66. 某社區因豪雨造成多戶居民受災，里辦公處結合志工、慈善團體及居民共同提供物資、臨時住宿及心理支持，協助受災家庭恢復正常生活。此情境最符合 Warren 社區五大功能中的哪一項？
- (A)社會控制 (B)互相支援
(C)社會參與 (D)生產—分配—消費
67. 某國小校護辦理高血壓防治健康教育，於課程前後測量學生家長對低鹽飲食、規律運動及血壓控制的知識、態度與健康行為改變。上述最屬於何種評值？
- (A)衝擊評值 (Impact evaluation)
(B)成本效益評值 (Efficiency evaluation)
(C)合適性評值 (Relevance evaluation)
(D)結果評值 (Outcome evaluation)
68. 某校護推動「健康體位促進計畫」，分別訪談四位學生家長，其回應如下，依據跨理論模式 (TTM)，哪一位家長最屬於準備期 (Preparation)？
- (A)「我不認為孩子需要增加運動量」
(B)「我知道運動很重要，打算半年內開始陪孩子運動」
(C)「我已報名親子運動班，下週開始每週運動三次」
(D)「我已規律運動八個月，每週三次」
69. 衛生福利部國民健康署推動大腸癌篩檢政策，透過電視、廣播、報章雜誌、網路平台及社群媒體等多元管道，提升民眾對定期篩檢的認知與參與率。上述主要運用下列何種健康教育策略？
- (A)價值澄清法 (B)團體討論法
(C)示範法 (D)健康傳銷法
70. 某公司一年內發生 5 件失能職業傷害事件，職業衛生護理師欲計算失能傷害頻率 (Frequency Rate, FR)，除失能傷害件數外，尚須蒐集下列何項資料？
- (A)總工作時數 (B)傷害損失日數
(C)職業病發生率 (D)傷害嚴重度指數
71. 有關校園結核病防治措施，下列何者正確？①結核病主要經空氣飛沫核傳播，教室應維持良好通風 ②教職員生若咳嗽持續2週以上，應儘速就醫評估 ③都治計畫 (DOTS) 主要針對已確診結核病個案，由專人督導規律服藥 ④接觸者調查僅限與個案同住之家屬，不包括校園接觸者
- (A)①②③ (B)①③④ (C)②④ (D)①②④
72. 有關登革熱防治，下列敘述何者錯誤？
- (A)登革熱屬於第二類法定傳染病
(B)典型登革熱潛伏期約為 3~14 天，多數約4~7天
(C)登革熱可由病人直接傳染給其他人，因此需採飛沫隔離
(D)臺灣重要病媒蚊為埃及斑蚊及白線斑蚊

73. 某社區護理師欲探討高血壓患者是否較容易於10年內發生腦中風，因此追蹤一群有高血壓及無高血壓者10年，比較兩組腦中風的發生情形。此研究設計最符合下列何者？
(A)世代研究（Cohort study）
(B)病例對照研究（Case-control study）
(C)橫斷研究（Cross-sectional study）
(D)生態研究（Ecological study）
74. 某研究者招募未罹患過敏性鼻炎之學童，依其居住環境中二氧化硫濃度分為高暴露組與低暴露組，追蹤6年後比較兩組過敏性鼻炎發生率，結果相對危險性（RR）3.0。下列推論何者最適當？
(A)高濃度二氧化硫暴露可能降低過敏性鼻炎風險
(B)高濃度二氧化硫暴露與過敏性鼻炎發生無關
(C)高濃度二氧化硫暴露組發生過敏性鼻炎的風險約為低暴露組的3倍
(D)低暴露組過敏性鼻炎發生率高於高暴露組
75. 有關慢性病（Chronic diseases）的特性，下列敘述何者正確？①病程通常較長，需長期治療或健康管理 ②慢性病僅發生於高齡人口 ③慢性病可能造成功能受限、失能或生活品質下降 ④慢性病多可於短時間內完全治癒
(A)①② (B)①③ (C)②④ (D)③④
76. 有關第2型糖尿病患者慢性併發症之定期追蹤與篩檢，下列何者不屬於建議之常規檢查項目？
(A)每年散瞳眼底（視網膜）檢查
(B)尿中白蛋白（Urine Albumin-to-Creatinine Ratio, UACR）檢查
(C)血清癌胚抗原（Carcinoembryonic Antigen, CEA）檢查
(D)足部神經感覺及周邊血管評估
77. 有關全民健康保險居家護理服務內容，下列何者不屬於居家護理人員主要提供之服務？
(A)壓傷傷口照護
(B)導尿管及鼻胃管照護
(C)代領慢性病連續處方箋藥物
(D)居家照護衛教及照顧者指導
78. 有關獨居長者預防跌倒之居家安全措施，下列何者最適當？
(A)室內照明不足屬於內在危險因子
(B)浴室入口可鋪設活動地毯，以增加止滑效果
(C)保持室內照明充足，固定家具及常用物品位置，並移除走道障礙物
(D)預防跌倒屬於三段五級預防中的第四級預防
79. 有關出院準備服務（Discharge Planning）之敘述，下列何者最不適當？
(A)強調跨專業團隊合作，提供整合性照護
(B)應於住院期間儘早評估病人及家屬需求，規劃出院後照護
(C)協助病人銜接居家照護、社區資源或長期照顧服務
(D)病人出院返家後，即完成所有出院準備服務，不需再進行追蹤或照護銜接

80. 關於長期照護型機構的人員配置，下列敘述何項錯誤？

- (A)長照機構每照顧30人應配置護理師一人
- (B)長照機構照護型的日間照顧每5人，應設置照顧服務員一人
- (C)長照機構設置有日間照護者，每20人之服務量，應增置一名護理師
- (D)養護機構隨時應保持至少一位護理人員值班

試題公告
僅供參考