

115 年度臺中市政府所屬機關及學校護理人員
暨公立幼兒園契約進用護理人員聯合甄選
緊急救護科

讀完本頁的說明，聽從監試委員的指示才開始作答

※請先確認你的答案卡、准考證與座位號碼是否一致無誤。

請閱讀以下測驗作答說明

測驗說明：

115 年度臺中市政府所屬機關及學校護理人員暨公立幼兒園契約進用護理人員聯合甄選，緊急救護科題本，題本採雙面印刷，共 80 題，測驗時間 90 分鐘，作答開始與結束請聽從監試委員的指示。

注意事項：

1. 所有試題均為四選一的選擇題，答錯不倒扣。
2. 依試場規則規定，答案卡上不得書寫姓名及任何標記。故意污損答案卡、損壞試題本，或在答案卡上顯示自己身份者，該科測驗不予計分。

作答方式：

請依照題意從四個選項中選出一個正確或最佳的答案，並用 2B 鉛筆在答案卡上相應的位置劃記，請務必將選項塗黑、塗滿。如果需要修改答案，請使用橡皮擦擦拭乾淨，重新塗黑答案。

請聽到鈴（鐘）聲響後再翻頁作答

試題公告
僅供參考

選擇題（共 80 題，每題 1.25 分，共 100 分，答錯不倒扣）

- 32歲女性帶新生兒至衛生所接種疫苗，因嬰兒持續哭鬧而突然情緒緊張、呼吸急促，表示胸悶、頭暈、口周圍及雙手指尖發麻。護理人員評估其意識清楚，RR：32次／分、HR：108次／分、BP：124/76 mmHg、SpO₂：99%，雙側呼吸音清楚，無胸痛、無單側肢體無力。下列處置何者最適當？
(A)立即給予高濃度氧氣，並要求持續深呼吸
(B)協助採舒適坐姿，安撫情緒、引導緩慢規律呼吸並持續觀察症狀變化
(C)請個案平躺並抬高雙腿，避免再與其交談
(D)因血氧正常，直接讓個案返家，不需再評估生命徵象
- 48歲女性國小教師，有氣喘病史。整理老舊教材時吸入大量灰塵，隨後出現胸悶、喘鳴與呼吸急促。護理人員評估其意識清楚，SpO₂ 93%。下列處置何者錯誤？
(A)離開灰塵環境
(B)協助採坐姿並放鬆緊身衣物
(C)協助依其處方使用短效支氣管擴張劑
(D)採取平躺以減少耗氧
- 67歲男性，至衛生所慢性病門診，有膽結石病史。今日出現右上腹痛、高燒39.3°C及皮膚、眼白發黃。此三項表現稱為何者？
(A)Cushing triad (B)Charcot's triad
(C)Beck triad (D)Virchow triad
- 61歲男性，至衛生所慢性病門診，健檢結果為腰圍：95 cm、BP：126/80 mmHg、空腹血糖：122 mg/dL、三酸甘油脂：196 mg/dL、高密度脂蛋白(HDL-C)：45 mg/dL。根據代謝症候群的標準，下列判定何者正確？
(A)兩項異常 (B)三項異常
(C)四項異常 (D)五項異常
- 38歲男性，至衛生所慢性病門診，有氣喘病史，醫師開立定量噴霧吸入器(MDI)及乾粉吸入器(DPI)藥物使用。護理師衛教並比較MDI與DPI的使用方式，下列何者正確？
(A)MDI與DPI都需要按壓藥罐
(B)MDI與DPI都應快速有力吸氣
(C)MDI需緩慢深吸氣，DPI需快速深吸氣
(D)MDI與DPI都可以使用吸藥輔助器
- 國小六年級學生於校外教學時疑似遭毒蛇咬傷小腿，傷口疼痛、腫脹。下列處置何者正確？ ①移除戒指、腳環等可能影響循環的緊束物 ②保持傷患安靜，固定患肢並使其低於心臟 ③冰敷傷口以減緩蛇毒吸收 ④以酒精消毒傷口
(A)①② (B)①③ (C)②④ (D)①④
- 國中一年級學生，在樓梯跌倒後閉眼躺在地上。校護到現場後呼喚其姓名時會睜眼，回答問題時言語混亂但可交談，並能依指示握手。依照格拉斯哥昏迷量表(Glasgow Coma Scale, GCS)評估結果為何？
(A)E2V3M5 (B)E3V4M6 (C)E3V5M5 (D)E4V4M6

8. 16歲男性學生於校門口發生車禍，造成嚴重頭部外傷。現有自發呼吸，BP：132/76 mmHg、HR：58次／分，無明顯外出血，頸部疼痛且曾短暫意識不清。等待救護車期間，下列處置何者最適當？
- (A)採頭低腳高姿勢，以增加腦部灌流
(B)將頭部單獨轉向一側，以預防吸入
(C)維持頭頸與軀幹中立軸線，在不影響脊椎固定、呼吸及循環下，將擔架頭端整體抬高約30°
(D)將枕頭墊於頸部下方，使頸部後仰以維持呼吸道
9. 62歲女性公立幼兒園廚工，突然出現左側臉歪及手臂無力。救護車抵達前症狀已明顯改善。下列何者最適當？
- (A)症狀已改善可不需送醫
(B)請個案先回家休息
(C)仍依照急性中風流程送醫
(D)請個案走動測試是否完全恢復
10. 18歲女性高中生，月經來潮第1天，突然出現右下腹劇烈疼痛，伴隨持續嘔吐、臉色蒼白及無法行走。校護評估BT：36.8°C、HR：124次／分、BP：92/58 mmHg，腹痛以右下腹最明顯，休息後仍未緩解。下列處置何者最適當？
- (A)判斷為原發性經痛，給予熱敷及止痛藥後觀察
(B)懷疑卵巢扭轉、囊腫破裂或其他急腹症，禁食禁水並立即送醫
(C)鼓勵走動，以促進經血排出
(D)先觀察月經量是否增加，再決定是否就醫
11. 67歲男性至衛生所換藥，有糖尿病及慢性腎臟病史。護理師發現傷口紅腫範圍較前次擴大、疼痛增加並有膿性滲液。評估BT：38.2°C、HR：118次／分、RR：24次／分、BP：92/60 mmHg，個案精神倦怠且尿量減少。下列處置何者最適當？
- (A)以生理食鹽水加強清潔後安排一週追蹤
(B)使用吸收性較強的敷料後返家觀察
(C)懷疑傷口感染併發敗血症，評估ABC、立即啟動119並持續監測
(D)先採集傷口分泌物，待培養結果後再決定是否送醫
12. 有關蜂螫及其措施之敘述，下列敘述何者錯誤？
- (A)可能出現噁心嘔吐及腹痛等腸胃症狀
(B)蜂螫後10-14天可能出現延遲性過敏反應
(C)避免食物暴露在人體附近，也是預防蜂螫的方法
(D)傷口可用酸性氨水或小蘇打水塗抹傷處來中和毒液
13. 根據 2025 年 AHA (American Heart Association) 準則，對於呼吸停止但有脈搏的成人患者，專業醫護人員應如何給予通氣？
- (A)每5秒給予1次通氣（每分鐘 12 次）
(B)每6秒給予1次通氣（每分鐘 10 次）
(C)每3秒給予1次通氣（每分鐘 20 次）
(D)每10秒給予1次通氣（每分鐘 6 次）
14. 在院外遇到無血壓計可測量血壓情況下，若藉由觸診頸動脈才可測得脈搏時，代表收縮壓至少為多少mmHg？
- (A)90 (B)80 (C)70 (D)60

15. 大量傷患的初級檢傷分類START原則，不包括下列哪一項？
(A)疼痛 (B)呼吸 (C)循環 (D)意識
16. 17歲男同學因熬夜與壓力過大，在教室突然出現全身僵硬，接著四肢抽搐，歷時2分鐘後停止抽搐。下列關於該患者的護理措施，何者正確？
(A)立即給予患者書包中的口服鎮靜劑
(B)發作時可適度按壓患者四肢，以防受傷
(C)保持患者側臥位，以協助唾液引流
(D)使患者躺於地板，嘗試叫醒患者
17. 有關毒蛇咬傷之評估處置，下列敘述何者錯誤？
(A)保持患部高於心臟部位，避免患肢過度活動
(B)出血性蛇毒的傷口會有局部腫脹、疼痛、瘀血、血泡等症狀
(C)神經性蛇毒可能產生眼皮下垂、肢體麻木、肌肉無力等症狀
(D)禁止局部切開傷口，勿使用冰敷以免造成局部組織壞死
18. 有關溺水的評估處置，下列敘述何者錯誤？
(A)清除呼吸道異物
(B)搬運時要注意頸部固定
(C)患者意識清醒也要送醫
(D)要清除吸入的水分
19. 有關誤食酸鹼化學物質之處置，下列敘述何者錯誤？
(A)若誤食強酸強鹼，無解毒劑
(B)若誤食，禁忌催吐，需禁食
(C)鹼性化學物質主要造成皮膚黏膜凝固性壞死
(D)鹼性化學物質的傷害較酸性化學物質嚴重
20. 有關熱中暑的敘述，下列何者錯誤？
(A)指核心體溫大於 40°C ，合併多重器官衰竭與中樞神經功能障礙
(B)長時間暴露於高溫環境，導致汗腺疲乏而使排汗減少及降低散熱能力
(C)導因為體內出汗調節衰竭，使得熱能堆積體內引發全身發炎反應
(D)治療原則為快速降溫，當核心體溫下降至 37.8°C 時才停止降溫
21. 有關食物中毒的敘述，下列何者錯誤？
(A)沙門氏菌會產生內毒素，是引起發燒的主因
(B)金黃色葡萄球菌食物中毒，只侵犯腸胃道
(C)食物中毒送醫前可刺激喉嚨或飲用大量淡鹽水催吐
(D)肉毒桿菌屬外毒素，其中毒死亡率低
22. 使用自動體外心臟電擊去顫器(AED)時，下列哪些為正確操作？①貼片前確認患者胸部乾燥 ②分析心律時施救者不可接觸患者 ③電擊後立即恢復胸部按壓 ④患者體表潮濕時可直接貼片電擊 ⑤貼片應避開植入式心律調節器凸起處
(A)①②③⑤ (B)①②④⑤ (C)②③④⑤ (D)①③④⑤

23. 關於止血帶(tourniquet)之使用，下列敘述何者錯誤？
(A)用於直接加壓無法控制之四肢大出血
(B)應綁於傷口近端並記錄上止血帶之時間
(C)應避開關節處
(D)應每10分鐘鬆綁一次以恢復血流
24. 學生踝關節急性扭傷後，下列護理措施何者錯誤？
(A)受傷後48小時內冰敷
(B)以彈性繃帶適度加壓
(C)抬高患肢高於心臟
(D)受傷初期即予熱敷以促進循環
25. 依九則計算法(rule of nines)，成人單側下肢全部加上會陰部之燒傷面積，約佔體表面積之百分之多少？
(A) 18% (B) 19% (C) 27% (D) 28%
26. 幼童因發燒引起熱性痙攣(febrile convulsion)，下列敘述何者正確？
(A)典型熱性痙攣多預後良好，少留下神經損傷
(B)發作時應立即約束肢體以停止抽搐
(C)僅見於體溫 37.5°C 以下之幼童
(D)發作後必然遺留智能障礙
27. 有關糖尿病急性高血糖危症之鑑別，下列敘述何者正確？
(A)糖尿病酮酸中毒(DKA)多見於第一型糖尿病，血中酮體顯著升高
(B)高血糖高滲透壓狀態(HHS)必伴隨明顯酮酸中毒
(C)DKA病人血糖通常正常
(D)HHS多見於第一型糖尿病兒童
28. 有關各類休克之分類，下列配對何者錯誤？
(A)心包填塞屬阻塞性休克
(B)過敏性休克屬散布性休克
(C)嚴重嘔吐腹瀉所致屬低血容積性休克
(D)大量心肌梗塞所致屬分布性休克
29. 有關各類休克早期之血流動力學表現，下列鑑別何者正確？
(A)心因性休克病人因心輸出量下降，四肢多濕冷
(B)敗血性休克早期(暖休克)四肢必為冰冷蒼白
(C)心因性休克之中心靜脈壓必然偏低
(D)敗血性休克一律不會發燒
30. 有關意外傷害的失血量分級與臨床表現，下列敘述何者錯誤？
(A)第一級失血($<15\%$)生命徵象多仍穩定
(B)第二級失血常見心跳加快
(C)第三級失血可出現血壓下降
(D)失血量越大，微血管充盈時間越短
31. 對橫紋肌溶解症學生之處置，下列何者不恰當？
(A)儘速送醫並補充水分
(B)注意尿量與腎功能變化
(C)限制水分以減少腎臟負擔
(D)觀察是否出現電解質異常

32. 有關台灣急診檢傷與急迫度分級量表(TTAS)之敘述，下列何者正確？
(A)共分為三級
(B)共分為五級，第一級為復甦急救、最緊急
(C)共分為五級，第五級最緊急
(D)級數越高代表病情越危急
33. 未滿5歲幼童感染腸病毒，下列哪些屬於併發重症之前兆病徵，應立即送大醫院？①嗜睡、意識不清 ②肌躍型抽搐(肢體突發性抖動) ③持續嘔吐 ④呼吸急促或心跳加快 ⑤手足口腔出現紅疹水泡
(A)①②③④ (B)①②③⑤ (C)②③④⑤ (D)①③④⑤
34. 學生誤飲清潔劑(漂白水)約20毫升，下列處置何者最適宜？
(A)立即催吐以排出毒物
(B)攜帶該瓶裝溶液(或標籤)儘速就醫
(C)給予大量飲水並反覆催吐
(D)給予吐根糖漿協助排空胃部
35. 懷孕後期之教師於進食時突然雙手掐住頸部、無法發聲(完全哽塞)，下列處置何者正確？
(A)施以腹部快速推擠法 (B)改採胸部快速推擠法
(C)拍背後立即觀察 (D)立即撥打119後在旁等待
36. 依緊急醫療救護法規定，救護人員以外之人，為免除他人生命之急迫危險而善意施予緊急救護者，下列敘述何者正確？
(A)一律須負民事損害賠償責任
(B)適用民法及刑法緊急避難之免責規定
(C)僅限具醫護背景者方可免責
(D)須事先取得家屬書面同意始得免責
37. 無收縮心臟電氣活動 (pulseless electrical activity, PEA) 最常見之5H5T不包括下列何者？
(A)缺氧 (B)張力性氣胸 (C)低血鈉 (D)心包填塞
38. 一位學生於泳池溺水，請問下列緊急處置何者正確？
(A)發現無呼吸心跳可直接於學生身體潮濕時使用AED
(B)依然採用ABCD的急救順序
(C)學生溺水後可能吞入大量液體，應盡速幫忙催吐排出腹部及肺部的水
(D)評估學生無呼吸心跳後且周圍無其他人時，優先求救再回來進行急救
39. 關於穩定型心絞痛之敘述下列何者錯誤？
(A)持續時間約5~10分鐘 (B)可能為心肌梗塞的前兆
(C)發作時間是可預測的 (D)可透過服用NTG改善
40. 一位60歲男性教師，因有心絞痛病史，隨身攜帶NTG(硝酸甘油脂)舌下含片，對於NTG下列何者錯誤？
(A)最多含服至5片，若還是無效需盡快就醫
(B)可同時減輕心臟前、後負荷
(C)需存放在不透光深色玻璃瓶
(D)使用後易導致姿位性低血壓，應避免突然起身

41. 下列何者不是顱底骨折可能出現之徵象？
(A)巴特爾氏徵象 (Battle's Sign) (B)光暈徵象 (Halo Sign)
(C)布魯辛斯基氏徵象 (Brudzinski's Sign) (D)浣熊眼 (Raccoon eyes)
42. 一位學生在打球時，頭部遭受重擊，導致硬腦膜上血腫，請問下列何者正確？
(A)是因外力導致靜脈血管破裂
(B)可能會先喪失意識，後進入清明期 (Lucid Interval)
(C)老年人因大腦萎縮較易發生
(D)若昏迷後清醒可不必再評估意識狀態
43. 關於癲癇下列哪些敘述正確？①大發作之強直期約持續10-20秒 ②在發作前數分鐘的改變，如舌頭有金屬味，稱為前驅期 ③發作後期指已從發作中恢復，不再有混亂的現象 ④簡單性局部發作自腳與軀幹開始 ⑤發作類型分為局部型 (Focal Onset)、泛發型 (Generalized Onset) 及不明型 (Unknown Onset) ⑥藥物發作導因可能與過量使用 Penicillin 有關
(A)①②⑤ (B)①⑤⑥ (C)②③⑥ (D)③④⑤
44. 關於氣胸的敘述，下列哪些是錯誤？①會出現快而淺的呼吸 ②只有閉鎖式氣胸會導致肋膜壓上升 ③橫膈離軌度上升 ④可能出現咳血
(A)①② (B)①④ (C)②③ (D)③④
45. 一位55歲男性教師患有肝硬化病史，請問下列有關肝硬化之敘述何者錯誤？
(A)可能為門脈高壓所致 (B)合併有腹水時，平時應採限鉀飲食
(C)可透過食道球止血 (D)需評估生命徵象及出血情形
46. 關於阻塞性黃疸，下列何者錯誤？
(A)會導致糞便呈灰白色 (B)凝血酶原時間不受影響
(C)可能與膽管結石有關 (D)血中膽紅素升高
47. 一名45歲女性教師覺得上腹部疼痛，且尿液呈茶色，發現為膽道結石導致的膽囊炎，請問下列敘述何者正確？
(A)會有羅氏徵象 (Rovsing's Sign) 陽性
(B)長期口服避孕藥可能導致膽結石
(C)疼痛會輻射至左肩及背部
(D)墨菲氏徵象 (Murphy's Sign) 為吐氣時觸摸右上腹會導致強烈疼痛
48. 一位學生於校內意外墜樓，下列敘述何者錯誤？
(A)因出血量過多導致低血容積休克，最早出現之徵象為脈搏變快
(B)翻身時須採用圓滾木翻身法，一手放於頭、頸部後面，一手慢慢將其轉向
(C)手腳因骨折而彎曲時應嘗試擺正
(D)若無呼吸心跳，則優先開始心肺復甦
49. 台灣夏天天氣悶熱，易造成熱傷害，下列關於熱傷害何者錯誤？
(A)中暑可給予靜脈輸注低張溶液
(B)熱衰竭合併休克現象可以抬高下肢
(C)中暑時可給予冰袋置於腹股溝、頭部
(D)可給予熱痙攣病人鹽水或稀釋後運動飲料

50. 下列蜂螫的處置何者錯誤？
(A)不可用鑷子移除螫針 (B)可用弱酸性的檸檬汁塗抹中和蜂毒
(C)冰敷螫傷傷口 (D)塗抹抗過敏藥膏
51. 對於不同程度之體溫過低下列何者正確？
(A)體溫30.6~32.2°C為重度體溫過低 (B)重度體溫過低會導致瞳孔縮小
(C)中度體溫過低會導致血壓上升 (D)體溫32.2~35°C會導致血壓上升
52. 有關有機磷中毒的臨床表徵與神經毒性配對下列哪些正確？①蕁毒樣中毒：分泌物增加
②蕁毒樣中毒：呼吸抑制 ③菸鹼樣中毒：血壓下降 ④菸鹼樣中毒：低血糖
(A)①② (B)①③ (C)②④ (D)③④
53. 下列何者不是一氧化碳中毒之症狀？
(A)皮膚可能蒼白或粉紅色 (B)可能心悸或精神混亂
(C)會有肌肉無力 (D)會有腹瀉發生
54. 對於一位有先天性糖尿病之男性教師，下列哪一項關於胰島素療法常見不良反應之低血糖敘述正確？
(A)可能與空腹飲酒有關
(B)發燒會減慢胰島素的吸收
(C)胰島素皮下注射時，以下肢吸收最快
(D)注射於非運動肢體的吸收速率較運動肢體快
55. 一位有第I型糖尿病之國中三年級女同學，在使用胰島素後發生黎明現象，關於胰島素療法導致的黎明現象，下列何者錯誤？
(A)凌晨會出現高血糖的現象 (B)是因午夜過後生長激素分泌導致
(C)午夜時會出現低血糖 (D)通常持續至早上8~9點
56. 一名5歲的女童在幼兒園，突發腹痛，後續發現是腸套疊，關於腸套疊下列哪些正確？
①可能導致腹膜炎 ②常見於5~12歲的兒童 ③可能會有紅色果膠狀大便 ④合併出現腹膜炎仍優先灌腸以治療腸套疊
(A)①④ (B)②③ (C)②④ (D)①③
57. 學生不慎碰觸高壓電，導致電燒傷，下列關於電燒傷的敘述哪些正確？①會導致皮膚乾燥、溫熱 ②不一定能在體表看到電流入口處 ③心電圖可能出現非特異性ST-T改變
④不會有血尿
(A)①④ (B)②③ (C)①③ (D)②④
58. 一位有PSVT疾病史之教職員，於上課時突感心跳加快、胸悶，認為是PSVT，請問關於PSVT之處置下列何者錯誤？
(A)可用頸動脈竇按摩改善症狀
(B)症狀輕微者可透過休息自行緩解
(C)伐氏操作(Valsalva Maneuver)會加重症狀，應避免
(D) β -blocker可用來緩解症狀
59. 關於Dopamine的敘述下列哪些正確？①低劑量可使心跳增強 ②中劑量可使心輸出量增加 ③高劑量可顯著增加心臟前負荷 ④超高劑量可使尿量增加
(A)①② (B)②③ (C)③④ (D)②④

60. 下列急救藥物對應適應症哪項錯誤？
(A) Amiodarone; 心室心搏過速
(B) Sodium Bicarbonate; 缺氧導致的酸中毒
(C) Atropine; 心房撲動
(D) Epinephrine; 心跳停止
61. 急救過程中病人出現哪些情況，AED不會建議電擊？ ①心室纖維顫動 (Ventricular fibrillation) ②無脈性心室頻脈 (Pulseless ventricular tachycardia) ③心房顫動 (Atrial fibrillation) ④心搏停止(Asystole) ⑤無脈性電氣活動 (Pulseless electrical activity)
(A) ①②④ (B) ③④⑤ (C) ①②③ (D) ①③⑤
62. 以下藥物、毒物中毒與其解毒劑的配對何錯誤？
(A) 有機磷中毒的解毒劑為PAM和 Atropine
(B) 鴉片類藥物中毒的解毒劑為Naloxone
(C) Benzodiazepine中毒的解毒劑為Deferoxamine
(D) 鉛中毒的解毒劑為EDTA
63. 就讀8年級的楊同學和家人在暑假期間去環島旅遊，返家3天後開始出現發燒、全身痛、身上多處長疹子，至急診就醫初步診斷為登革熱。請問以下有關登革熱的敘述何者正確？
①登革熱屬於我國法定傳染病，確診後應依法通報 ②急性期常見白血球上升及血小板增生 ③疑似登革熱病人應避免服用 Aspirin類藥物，以免增加出血風險 ④學校發現疑似個案，應立即進行校園環境積水容器巡檢及孳生源清除 ⑤登革熱主要經由病人咳嗽、飛沫及空氣傳播，須入住隔離病房
(A) ②③④⑤ (B) ①②③④ (C) ②③⑤ (D) ①③④
64. 就讀國小二年級的王同學近2天出現發燒、喉嚨痛及口腔潰瘍，今日手掌及足底出現多處小水泡，經醫師診斷為腸病毒感染。返家休息當晚，家長發現王同學開始出現嗜睡、持續嘔吐及手腳無力，立即送至急診，確診腸病毒感染併發重症入住加護病房治療。請問下列有關腸病毒的敘述何者正確？ ①手足口病是腸病毒常見臨床表現，病人常因口腔潰瘍造成疼痛而拒食 ②腸病毒發病後1周內傳染力最高 ③治療措施以服用抗病毒藥物為主 ④腸病毒可經糞口、飛沫及接觸傳播，加強手部衛生是防治措施之一 ⑤腸病毒重症前兆包括持續嗜睡、反覆嘔吐及呼吸急促。
(A) ①②③④⑤ (B) ①②③⑤ (C) ①②④⑤ (D) ②③④⑤
65. 病人誤食腐蝕性物質，下列處置何者錯誤？
(A) 不可催吐 (B) 不可自行酸鹼中和
(C) 儘快洗胃，減少腐蝕性物質吸收 (D) 禁給牛奶
66. 溫老師在協助整理校園樹木時，不慎遭電鋸截斷左手食指，校護到場協助處理。下列與創傷性截肢與斷肢敘述的方式何者錯誤？
(A) 大肢體接合手術在受傷後6-12小時內完成提高接合成功率
(B) 使用生理食鹽水輕沖洗斷肢表面的污物
(C) 將斷肢浸泡於冰水或生理食鹽水，以降低組織代謝
(D) 先控制截肢端出血，再將斷肢以濕紗布包覆、放入防水塑膠袋密封後，再置於裝有冰塊的容器中保存

67. 評量心肺復甦術的效果，以下何者正確？
(A)評估時可中斷CPR時間上限20秒
(B)瞳孔放大是CPR成功的跡象
(C)施行胸部按壓及人工呼吸2個循環後，應評估頸動脈有無搏動
(D)停止心肺復甦術情況包括恢復心跳與呼吸或施救者力竭無法繼續執行
68. 成人意識清楚發生上呼吸道梗塞時優先處理方式為何？
(A)拍背壓胸法
(B)鼓勵用力咳嗽將堵塞物咳出
(C)拍背壓胸法
(D)手指挖除法
69. 謝同學因打籃球跌倒造成右側腓骨閉鎖性骨折，急診處置給予復位後打長腿石膏固定，返家休養並安排骨科門診追蹤。進行衛教時，下列針對打石膏48小時內的照護措施何者錯誤？
(A)將患肢抬高於心臟以上，促進靜脈回流及減輕腫脹
(B)可使用吹風機熱風或烤燈加速石膏乾燥，強化固定效果
(C)石膏未完全乾燥前，勿使用棉被或厚重衣物覆蓋，以利散熱及乾燥
(D)續觀察患肢遠端的循環、感覺、運動及疼痛等神經血管功能改變
70. 萊老師下班時在學校門口被外面的野狗咬到，造成臉部和下肢的撕裂傷，請問以下何者錯誤？
(A)儘快縫合傷口，降低感染機會
(B)較深的傷口要評估神經血管受損情形
(C)打破傷風及預防性抗生素使用
(D)使用生理食鹽水清潔傷口
71. 休克病人的病程進展可能相當快速，以下有關休克敘述何者錯誤？
(A)要確保呼吸道通暢，維持身體氧合
(B)平躺抬高下肢30度，增加回心血量
(C)建立靜脈輸液，增加灌流量
(D)休克治療後改善指標為每小時尿量 $< 30\text{ mL}$ ，使用升壓劑期間收縮壓維持 $> 90\text{ mmHg}$
72. 胃灌洗是藥物、毒物中毒病人減少毒物吸收的措施，請問以下有關胃灌洗描述何者錯誤？
(A)採右側臥姿勢
(B)中毒1小時內施行較有效
(C)使用生理食鹽水進行灌洗
(D)胃灌洗後應注意是否發生電解質或酸鹼不平衡情形
73. 台灣常見毒蛇分類，下列何者正確？
(A)雨傘節屬於神經性毒蛇
(B)百步蛇屬於神經性毒蛇
(C)青竹絲屬於神經性毒蛇
(D)龜殼花屬於神經性毒蛇
74. 國際上大量傷患事故常用START檢傷分類法，病人依照顏色區分嚴重度，下列敘述何者正確？
①紅色代表立即處置 ②黃色代表輕傷 ③綠色代表延遲處置 ④黑色代表死亡
(A)①②③④
(B)①②③
(C)①④
(D)②④

75. 神經性休克與低血容積性休克之差異，下列敘述何者正確？
(A)神經性休克臨床表徵有皮膚濕冷且心搏過速
(B)低血容積性休克臨床表徵心搏過速、皮膚濕冷
(C)神經性休克有時會出現高血壓
(D)低血容積性休克病人意識不會改變
76. 台灣急診檢傷急迫度分級量表(Taiwan Triage and Acuity Scale; TTAS)是急診檢傷分類依據準則，以下哪些項目是檢傷分級判定依據的項目？ ①生命徵象 ②過去病史 ③高危險性受傷機轉 ④疼痛程度 ⑤意識狀態
(A)①②③④⑤ (B)①②③⑤ (C)①③④⑤ (D)②③④⑤
77. 哪種類型的燒傷會出現心臟損傷或心律不整的合併症？
(A)電燒傷 (B)高溫燒傷 (C)吸入性燒傷 (D)化學性燒傷
78. 鄭老師有心臟病及高血壓的病史，在心臟科門診追蹤治療，有服用Furosemide利尿劑，最近幾天出現雙下肢無力而無法行走，伴隨有噁心嘔吐和疲倦的症狀，請問可能是發生哪種問題？
(A)高血鉀 (B)低血鉀 (C)高血鈣 (D)低血鈣
79. 凍先生和朋友去登山失聯2天，搜救人員找到後送入急診，當時生命徵象為BT：31°C, HR：50次／分, RR：12次／分, BP：88/54mmHg。請問以下針對凍先生的處置何者正確？
(A)中度低體溫病人可採體外回溫措施
(B)要快速提升病人體溫，縮短低體溫時間
(C)酒精可以幫助新陳代謝及升溫
(D)有肢體末梢凍傷可藉由摩擦、烤燈加熱改善循環
80. 八字固定帶適應症是哪個部位骨折？
(A)頸椎骨折 (B)鎖骨骨折 (C)肱骨骨折 (D)骨盆骨折